

CONTROLLED COPY

Afdeling:	Medisch ondersteunend>Medische microbiologie
Titel:	MMI: Bijlage doorbellijst onderzoeken arts microbioloog
Document ID en Versie:	038034; 4

GELDIG DOCUMENT

INDICATIES VOOR DOORBELLEN LABORATORIUMBEVINDINGEN DOOR ARTS-MICROBIOLOOG

Principe: geselecteerde laboratoriumbevindingen die bij een patiënt aanleiding kunnen zijn voor directe therapeutische aanpassingen (starten of uitbreiden antibiotica) of infectiepreventie aanpassingen (instellen of aanpassen isolatie):

- 1) Positieve kweken van bloed (m.u.v. mogelijke contaminanten), liquor, punctaten uit steriele lichaamsholten (uitgezonderd peritoneaalholte) van patiënten met een indicatie voor starten of uitbreiden van antibiotische profylaxe of therapie.

N.B.

- Indien er geen bovengenoemde indicatie is voor doorbellen dan de desbetreffende positieve kweek in consultmodule in HIX vermelden inclusief de aantekening dat hierover geen telefonisch contact is opgenomen.
 - Relevante nieuwe positieve bloedkweken van IC-patiënten altijd doorbellen!
- 2) Positieve MRSA kweken van opgenomen patiënten en van niet opgenomen uit een niet-surveillance kweek.
 - 3) Eerste positieve tuberculose testen van een patiënt (d.w.z. of auramine of PCR of kweek).
 - 4) Positieve serologische testen van patiënten met een indicatie voor óf starten dan wel uitbreiden van antibiotische therapie, en óf instellen of aanpassen van isolatie, en óf afname en insturen van een nieuw monster:
 - a. HIV test;
 - b. Nieuwe positieve RPR;
 - c. Mycoplasma IgM van opgenomen patiënten;
 - d. Clostridium toxine test van opgenomen patiënten;
 - e. Hepatitis A- IgM;
 - f. Hepatitis B surface Ag indien patiënt bron is van prikaccident;
 - g. Legionella antigeentest.
 - 5) Positieve PCR testen van opgenomen patiënten met een indicatie voor of behandeling en of instellen van isolatie:
 - a. Virale verwekkers luchtweginfecties (eventueel via deskundige infectiepreventie aan arts);
 - b. Virale verwekkers gastro-enteritis (eventueel via deskundige infectiepreventie aan arts);
 - c. Virale verwekkers (meningo-)encefalitis;
 - d. Bordetella pertussis.
 - 6) Negatieve CITO Varicella zoster IgG bij zwangeren.

Overigens:

Voor 2 t/m 5 geldt dat er geen indicatie is voor het doorbellen indien na het raadplegen van het desbetreffende HIX patiëntdossier door de arts-microbioloog blijkt dat:

- de patiënt bekend is met de aangetoonde kolonisatie/infectie (b.v. MRSA dragerschap, TBC);
- de patiënt reeds in isolatie is opgenomen.